

AVIFAUNA

PAUIS DA PRAIA DA VITÓRIA

Merganso cabeçudo

Lophodytes cucullatus (Linnaeus, 1758)



Ilustração @ David Allen Sibley

Descrição fenológica:


O Merganso cabeçudo é o merganso mais pequeno do Norte da América, com cerca de 40 a 49cm de comprimento e com um peso médio entre os 540 e os 680gr. Esta ave possui um bico longo, estreito e serrilhado.

No que respeita à plumagem é uma ave de fácil identificação, pois apresenta uma plumagem em tons castanho-acinzentado, com uma mancha branca sobre o peito inferior e barriga. As fêmeas desta espécie apresentam uma crista castanho-avermelhada, enquanto os machos apresentam uma plumagem mais escura e de cores mais defendidas, tendo estes cabeça preta com uma crista branca, em forma de leque. Os machos têm olhos amarelos brilhantes enquanto as fêmeas tem olhos acastanhados. Os juvenis desta espécie são muito semelhantes às fêmeas em termos de plumagem.

Distribuição

O Merganso cabeçudo distribui-se por toda a América do Norte, trata-se de uma ave migratória de média distância. Muitas destas aves movem-se para sul e sudoeste no Inverno, no entanto outras migram para Norte para passar o inverno na região dos grandes lagos e no sul do Canadá.

Esta espécie concentra-se normalmente em zonas florestais junto a lagos.



AVIFAUNA PAUIS DA PRAIA DA VITÓRIA

Habitat

A espécie *Lophodytes cucullatus* nidifica em zonas húmidas florestadas, preferindo pequenos corpos de água, lagos ou estuários onde há vegetação aquática emergente, no entanto, existem registos de nidificação desta espécie em locais não florestados e a nidificar em ninhos artificiais. Esta ave prefere água doce, no entanto também observada em água salobra.

Conservação

No século passado a conservação do merganso cabeçudo incidia mais sobre o excesso de caça sobre esta espécie, atualmente são várias as preocupações no que concerne à sua conservação, nomeadamente a conservação do seu habitat, pois a desflorestação e as práticas de agrícolas, tem alterado e diminuído o habitat desta ave.

Atualmente, o Merganso cabeçudo é muito comum na América e as suas populações estão estáveis e possivelmente aumentaram entre 1966 e 2015, de acordo com o “North American Breeding Bird Survey”.

Referências

<http://www.nhptv.org/natureworks/hoodedmerganser.htm>

<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=60E6081E>

http://animaldiversity.org/accounts/Lophodytes_cucullatus/

<http://www.audubon.org/field-guide/bird/hooded-merganser>

http://www.avesnest.com/spc/bird_view/2327/

https://www.allaboutbirds.org/guide/Hooded_Merganser/lifehistory